



Przyczyny przerwania zaopatrywania organizmu w tlen

Tablica przedstawia przyczyny przerwania zaopatrywania organizmu w tlen oraz podstawowe sposoby podtrzymania czynności życiowych

- [Przyczyny przerwania zaopatrywania organizmu w tlen](#)

Przyczyny przerwania zaopatrywania organizmu w tlen

Tablica przedstawia przyczyny przerwania zaopatrywania organizmu w tlen oraz podstawowe sposoby podtrzymania czynności życiowych

Przyczyny przerwania zaopatrywania organizmu w tlen:

1. Zatkanie dróg oddechowych.
2. Zatrzymanie oddychania.
3. Zatrzymanie krążenia.

Podstawowe sposoby podtrzymania czynności życiowych:

A – Udrożnienie dróg oddechowych – odchylenie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy do góry (ang. **A**irway), (w pozycji bocznej drogi oddechowe są drożne).

B – Podtrzymanie oddychania (wentylację) – oddechy ratownicze metodą usta – usta (ang. **B**reathing).

C – Podtrzymanie krążenia krwi – uciskanie klatki piersiowej (ang. **C**irculation).

Uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze określa się jako resuscytację krążeniowo-oddechową.

To, jakie czynności ratownicze należy wykonać, będzie zależało od wyniku oceny stanu poszkodowanego.