




## Problemy prowadzące do rozwiązywania równań kwadratowych z parametrem

- [Wprowadzenie](#)
- [Przeczytaj](#)
- [Galeria zdjęć interaktywnych](#)
- [Sprawdź się](#)
- [Dla nauczyciela](#)



## Problemy prowadzące do rozwiązywania równań kwadratowych z parametrem

Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

W tym materiale zajmiemy się problemami prowadzącymi do rozwiązywania równań kwadratowych z parametrem. Przeprowadzimy analizę położenia wykresu funkcji kwadratowej w zależności od parametru występującego we wzorze funkcji. Pokażemy również wykorzystanie równań kwadratowych z parametrem w innych działach matematyki – na przykład w trygonometrii.

### Twoje cele

- Znajdziesz wszystkie takie wartości rzeczywiste parametru, aby rozwiązania danego równania spełniały określony warunek.
- Wyznaczysz takie wartości parametru, aby wykres funkcji kwadratowej spełniał określony warunek.

# Przeczytaj

---

## Wzory Viete'a

Jeżeli równanie kwadratowe  $ax^2 + bx + c = 0$ , gdzie  $a \neq 0$ , ma pierwiastki  $x_1, x_2$ , to:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

oraz

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Wzory Viete'a są bardzo często wykorzystywane podczas rozwiązywania równań kwadratowych z parametrem.

W materiale wykorzystamy również własności funkcji kwadratowej i jej wykresu.

### Twierdzenie: Współrzędne wierzchołka paraboli

Parabola  $y = ax^2 + bx + c$  (gdzie liczba  $a$  jest różna od zera) ma wierzchołek w punkcie o współrzędnych:

$$p = -\frac{b}{2a}$$

$$q = -\frac{\Delta}{4a}$$

gdzie:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Jeżeli parabola ma wierzchołek w punkcie  $(p, q)$  to jej osią symetrii jest prosta  $x = p$ .

### Przykład 1

Wykażemy, że równanie  $kx^2 + (k + 3)x + 3 = 0$  ma rozwiązanie dla dowolnej wartości parametru  $k \neq 0$ .

$$kx^2 + (k + 3)x + 3 = 0$$

Aby równanie kwadratowe miało rozwiązanie  $\Delta \geq 0$ .

$$\Delta = (k + 3)^2 - 4 \cdot k \cdot 3 = k^2 + 6k + 9 - 12k = k^2 - 6k + 9 = (k - 3)^2$$

$(k - 3)^2 \geq 0$  dla  $k \in \mathbb{R}$ , bo kwadrat liczby rzeczywistej jest zawsze nieujemny.

Czyli dla  $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  równanie ma rozwiązanie.

## Przykład 2

Dane są funkcje  $f(x) = x^2 + 4$  i  $g(x) = -3x^2 + 2px$ . Obliczymy, dla jakich wartości parametru  $p$  parabole, będące wykresami funkcji  $f(x)$  i  $g(x)$  przecinają się w jednym punkcie, który znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.

Rozważymy równanie  $x^2 + 4 = -3x^2 + 2px$ .

$$4x^2 - 2px + 4 = 0$$

Aby równanie miało jedno rozwiązanie  $\Delta = 0$ .

$$\Delta = (2p)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4p^2 - 64$$

$$4p^2 - 64 = 0$$

$$p^2 - 16 = 0$$

$$p = -4 \text{ lub } p = 4$$

Dla  $p = -4$  otrzymujemy:

$$4x^2 - 2 \cdot (-4)x + 4 = 0$$

$$4x^2 + 8x + 4 = 0$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$(x + 1)^2 = 0$$

$$x = -1$$

Ponieważ pierwsza współrzędna punktu jest liczbą ujemną, więc punkt nie leży w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.

Dla  $p = 4$  otrzymujemy:

$$4x^2 - 8x + 4 = 0$$

$$4x^2 - 8x + 4 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$(x - 1)^2 = 0$$

$$x = 1$$

$$f(1) = 1^2 + 4 = 5$$

Ponieważ obie współrzędne punktu przecięcia wykresów są dodatnie, oznacza to, że dla  $p = 4$  punkt leży w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.

### Przykład 3

Obliczymy, dla jakich wartości parametru  $z$  funkcja  $f(x) = 2x^2 + (z - 1)x + z$  przyjmuje najmniejszą wartość, która jest liczbą ujemną.

$$f(x) = 2x^2 + (z - 1)x + z$$

Funkcja kwadratowa przyjmuje najmniejszą wartość, gdy współczynnik  $a > 0$ .

Dla funkcji  $f$  mamy  $a = 2 > 0$  dla  $z \in \mathbb{R}$ .

Funkcja kwadratowa przyjmuje najmniejszą wartość w wierzchołku paraboli, będącej wykresem funkcji.

Czyli  $q = \frac{-\Delta}{4a}$  jest najmniejszą wartością funkcji  $f$ .

$$\Delta = (z - 1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot z = z^2 - 2z + 1 - 8z = z^2 - 10z + 1$$

$$q = \frac{-(z^2 - 10z + 1)}{4 \cdot 2} = \frac{-(z^2 - 10z + 1)}{8}$$

Najmniejsza wartość funkcji  $f$  będzie liczbą ujemną dla  $\frac{-(z^2 - 10z + 1)}{8} < 0 \mid \cdot (-8)$ .

$$z^2 - 10z + 1 > 0$$

$$\Delta_z = 100 - 4 \cdot 1 = 96$$

$$\sqrt{\Delta_z} = \sqrt{96} = \sqrt{16 \cdot 6} = 4\sqrt{6}$$

$$z_1 = \frac{10 - 4\sqrt{6}}{2} = 5 - 2\sqrt{6}$$

$$z_2 = \frac{10 + 4\sqrt{6}}{2} = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$z \in \left(-\infty, 5 - 2\sqrt{6}\right) \cup \left(5 + 2\sqrt{6}, \infty\right)$$

### Przykład 4

Dla jakich wartości parametru  $k$  równanie  $x^2 + (k - 1)x + 2k - 1 = 0$  ma dwa rozwiązania takie, że jedno jest sinusem a drugie jest cosinusem tego samego kąta?

Niech  $x_1 = \sin \alpha$ ,  $x_2 = \cos \alpha$ .

Rozwiążemy układ warunków:

$$\begin{cases} 1. \Delta \geq 0 \\ 2. x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{cases}$$

1. Wyróżnik trójmianu kwadratowego ma być liczbą nieujemną, ponieważ równanie może mieć podwójny pierwiastek ( $\sin \alpha$  i  $\cos \alpha$  będą przyjmowały taką samą wartość).

$$\Delta = (k-1)^2 - 4 \cdot (2k-1) = k^2 - 2k + 1 - 8k + 4 = k^2 - 10k + 5$$

$$\Delta \geq 0 \Leftrightarrow k^2 - 10k + 5 \geq 0$$

$$\Delta_k = (-10)^2 - 4 \cdot 5 = 100 - 20 = 80$$

$$\sqrt{\Delta_k} = 4\sqrt{5}$$

$$k_1 = \frac{10-4\sqrt{5}}{2} = 5 - 2\sqrt{5}$$

$$k_2 = \frac{10+4\sqrt{5}}{2} = 5 + 2\sqrt{5}$$

$$k \in \left( -\infty, 5 - 2\sqrt{5} > \cup < 5 + 2\sqrt{5}, \infty \right)$$

2. Aby zachodziły warunki zadania musi być spełniona „jedynka trygonometryczna”.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$x_1^2 + x_2^2 = 1$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 = 1$$

$$(k-1)^2 - 2 \cdot (2k-1) = 1$$

$$k^2 - 6k + 2 = 0$$

$$\Delta = 36 - 4 \cdot 2 = 28$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

$$k_1 = \frac{6-2\sqrt{7}}{2} = 3 - \sqrt{7} \notin \left( -\infty, 5 - 2\sqrt{5} > \cup < 5 + 2\sqrt{5}, +\infty \right)$$

$$k_2 = \frac{6+2\sqrt{7}}{2} = 3 + \sqrt{7} \notin \left( -\infty, 5 - 2\sqrt{5} > \cup < 5 + 2\sqrt{5}, \infty \right)$$

Zatem nie istnieje wartość parametru  $k$  dla której równanie ma dwa rozwiązania takie, że jedno jest sinusem a drugie jest cosinusem tego samego kąta.

## Słownik

### wzory Viete'a

jeżeli równanie kwadratowe  $ax^2 + bx + c = 0$ , gdzie  $a \neq 0$ , ma pierwiastki  $x_1, x_2$ , to:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

oraz

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

### jedynka trygonometryczna

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$



# Galeria zdjęć interaktywnych

---

## Polecenie 1

Zapoznaj się z galerią zdjęć interaktywnych i przeanalizuj sposób obliczenia liczby rozwiązań równania dwukwadratowego z parametrem.




---

## Polecenie 2

Dla jakich wartości parametru  $m$  równanie  $x^4 - x^2 + 2m = 0$  ma cztery różne rozwiązania?

# Sprawdź się

---

Pokaż ćwiczenia:   

Ćwiczenie 1



Ćwiczenie 2



Ćwiczenie 3



Ćwiczenie 4



Ćwiczenie 5



Ćwiczenie 6



Ćwiczenie 7



Ćwiczenie 8



Uzasadnij, że dla dowolnej liczby  $m \in \mathbb{R}$  wykres funkcji  $f(x) = (1 - m)x^2 + mx - 1$  ma co najmniej jeden punkt wspólny z osią  $X$ .

# Dla nauczyciela

---

**Autor:** Jolanta Schilling

**Przedmiot:** Matematyka

**Temat:** Problemy prowadzące do rozwiązywania równań kwadratowych z parametrem

**Grupa docelowa:**

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

**Podstawa programowa:**

III. Równania i nierówności. Zakres rozszerzony.

Uczeń:

5) analizuje równania i nierówności liniowe z parametrami oraz równania i nierówności kwadratowe z parametrami, w szczególności wyznacza liczbę rozwiązań w zależności od parametrów, podaje warunki, przy których rozwiązania mają żądaną własność i wyznacza rozwiązania w zależności od parametrów.

**Kształtowane kompetencje kluczowe:**

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
- kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
- kompetencje cyfrowe
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

**Cele operacyjne:**

Uczeń:

- znajduje wszystkie takie wartości rzeczywiste parametru, aby rozwiązania danego równania spełniały określony warunek
- wyznacza takie wartości parametru, aby wykres funkcji kwadratowej spełniał określony warunek
- dobiera model matematyczny do określonej sytuacji

**Strategie nauczania:**

- konstruktywizm

## **Metody i techniki nauczania:**

- praca z tekstem
- dyskusja
- rozmowa nauczająca z wykorzystaniem galerii zdjęć interaktywnych

## **Formy pracy:**

- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca całego zespołu klasowego

## **Środki dydaktyczne:**

- komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki
- zasoby multimedialne zawarte w e-materiale
- tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

## **Przebieg lekcji**

### **Faza wstępna:**

1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.
2. Uczniowie przypominają sobie w grupach wiadomości i umiejętności związane ze sposobami rozwiązywania równań kwadratowych.

### **Faza realizacyjna:**

1. Uczniowie pracują w grupach metodą odwróconej klasy. Najpierw wymieniają się wiadomościami dotyczącymi wyznaczenia pierwiastków równania kwadratowego z parametrem, które przygotowali w domu.
2. Teraz uczniowie pracują w grupach 6 osobowych i omawiają przykłady z sekcji „Przeczytaj”.
3. Uczniowie oglądają galerię zdjęć interaktywnych i omawiają ją wraz z nauczycielem.
4. Uczniowie podzieleni na grupy 6 osobowe rozwiązują zadania interaktywne. Wspólnie omawiają odpowiedzi.

### **Faza podsumowująca:**

1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące ćwiczeń interaktywnych.
2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

### **Praca domowa:**

Uczniowie wykonują Polecenie 2 umieszczone pod galerią.

**Materiały pomocnicze:**

[Równanie kwadratowe](#)

**Wskazówki metodyczne:**

Przykłady zawarte w galerii zdjęć interaktywnych uczniowie mogą potraktować jako materiał powtórzeniowy przed pracą klasową. Mogą też wykorzystać je jako wstęp do zajęć związanych z rozwiązywaniem nierówności kwadratowych z parametrem.