


Jak zmieniają się właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków w obrębie okresów?

- [Wprowadzenie](#)
- [Przeczytaj](#)
- [Film edukacyjny](#)
- [Sprawdź się](#)
- [Dla nauczyciela](#)



## Jak zmieniają się właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków w obrębie okresów?

Pierwotny układ okresowy powstał w 1869 roku dzięki Dymitrowi Mendelejewowi, na podstawie odkrytego przez niego prawa okresowości.

Źródło: dostępny w internecie: focus.pl, domena publiczna.

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków zmieniają się w obrębie grup układu okresowego. Okresowe zmiany tych samych właściwości można zaobserwować także w obrębie okresów. Oznacza to, że jeśli zrozumiesz, jak zmienia się, przykładowo, wartość promienia atomowego w drugim okresie, to w podobny sposób wyjaśnisz jego zmianę w trzecim okresie. Opisuje to prawo okresowości, które mówi, że właściwości pierwiastków zmieniają się okresowo wraz ze wzrostem liczby atomowej.

### Twoje cele

- Sformułujesz wniosek dotyczący zmiany wartości promienia atomowego w okresie.
- Połączysz zmiany wielkości promieni atomowych w okresie ze zmianą energii jonizacji.
- Sformułujesz wniosek dotyczący zmiany wartości powinowactwa elektronowego w okresie.
- Uzasadnisz zmiany elektroujemności w okresie.

- Ocenisz, jakie czynniki mają wpływ na zmianę charakteru metalicznego i niemetalicznego pierwiastków.


# Przeczytaj

## Właściwości fizyczne

### Promień atomowy

#### Już wiesz

W sieci krystalicznej, składającej się z uporządkowanych atomów ściśle przylegających do siebie, istnieje możliwość zmierzenia odległości pomiędzy dwoma jądrami sąsiednich atomów tego samego pierwiastka. Połowa tej odległości to [promień atomowy](#).



Promień atomowy jest zdefiniowany jako połowa odległości między jądrami atomów tego samego pierwiastka.

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Spójrzmy na promienie atomowe pierwiastków 2. okresu, które dla danego pierwiastka są umieszczone w zielonym półkolu (w układzie okresowym zamieszczonym poniżej) i wyrażone w pm (pikometr,  $10^{-12}$  m). Promień atomowy atomu litu wynosi 152 pm, kolejnego w okresie atomu, czyli berylu, wynosi 114 pm. Przechodząc do podpowłoki typu *p*, promień atomowy boru osiąga wartość 88 pm, węgla 77 pm, azotu 70 pm, tlenu 66 pm i fluoru 58 pm. Promień atomowy **w okresie maleje**. Od reguły tej są jednak wyjątki (zwróć uwagę, że w czasie rozważań bierzemy pod uwagę wyłącznie pierwiastki grup głównych układu okresowego i pomijamy również atomy gazów szlachetnych). Powodem, który sprawia, że atomy kolejnych pierwiastków danego okresu są coraz mniejsze, jest systematyczny wzrost ładunku jądra atomowego. Mocniej naładowane dodatnio jądro silniej przyciąga elektrony chmury elektronowej – skutkuje to przybliżeniem elektronów do jądra, a więc spadkiem wartości promienia atomowego.

Przykładowo atom litu posiada trzy protony w jądrze i trzy elektrony osadzone na dwóch powłokach. Natomiast atom berylu ma w jądrze cztery protony i cztery elektrony umieszczone na dwóch powłokach. W przypadku atomu berylu, przyciąganie elektronów przez jądro jest silniejsze niż w przypadku atomu litu, ponieważ im więcej protonów znajduje się w jądrze, tym większy ładunek jądra i tym silniej przyciągane są elektrony. Wraz ze wzrostem siły przyciągania między protonami a elektronami, promień zmniejsza się. Ten sam efekt zmniejszania się wartości promienia atomowego obserwujemy w przypadku pierwiastków trzeciego okresu.

### Polecenie 1

Przeanalizuj, jak zmieniają się wartości promieni atomowych i jonowych pierwiastków bloku *s* i *p*.

1																	18
1	2											13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H 1,01 1 H 1,01 (k)H 1s <sup>1</sup>	He 4,00 2 He 4,00 hel 1s <sup>2</sup>											B 10,81 5 B 10,81 (k)B 2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup>	C 12,01 6 C 12,01 (k)C 2s <sup>2</sup> 2p <sup>2</sup>	N 14,01 7 N 14,01 (k)N 2s <sup>2</sup> 2p <sup>3</sup>	O 16,00 8 O 16,00 (k)O 2s <sup>2</sup> 2p <sup>4</sup>	F 18,00 9 F 18,00 fluor 2s <sup>2</sup> 2p <sup>5</sup>	Ne 20,18 10 Ne 20,18 neon 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>średnia masa atomowa [u]</p> <p>liczba atomowa (liczba porządkowa)</p> <p>symbol pierwiastka</p> <p>symbol jonu; (k) - jon istnieje tylko w kryształach, a nie w roztworach wodnych</p> <p>nazwa pierwiastka</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>promień atomowy [pm] i jego ilustracja graficzna</p> <p>promień jonowy [pm] i jego ilustracja graficzna: pomarańczowy - kation, niebieski - anion</p> <p>konfiguracja elektronów walencyjnych</p> </div> </div>																	
Li 6,94 3 Li 6,94 lit 2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup>	Be 9,01 4 Be 9,01 beryl 2s <sup>2</sup>											Al 26,98 13 Al 26,98 (k)Al 3s <sup>2</sup> 3p <sup>1</sup>	Si 28,09 14 Si 28,09 (k)Si 3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup>	P 30,97 15 P 30,97 (k)P 3s <sup>2</sup> 3p <sup>3</sup>	S 32,07 16 S 32,07 siarka 3s <sup>2</sup> 3p <sup>4</sup>	Cl 35,45 17 Cl 35,45 chlor 3s <sup>2</sup> 3p <sup>5</sup>	Ar 39,95 18 Ar 39,95 argon 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup>
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39,10 4 K 39,10 potas 4s <sup>1</sup>	Ca 40,08 20 Ca 40,08 wapń 4s <sup>2</sup>	Sc 44,96 21 Sc 44,96 skand 4s <sup>2</sup> 3d <sup>1</sup>	Ti 47,87 22 Ti 47,87 tytan 4s <sup>2</sup> 3d <sup>2</sup>	V 50,94 23 V 50,94 wanad 4s <sup>2</sup> 3d <sup>3</sup>	Cr 52,00 24 Cr 52,00 chrom 4s <sup>1</sup> 3d <sup>5</sup>	Mn 54,94 25 Mn 54,94 mangan 4s <sup>2</sup> 3d <sup>5</sup>	Fe 55,85 26 Fe 55,85 żelazo 4s <sup>2</sup> 3d <sup>6</sup>	Co 58,93 27 Co 58,93 kobalt 4s <sup>2</sup> 3d <sup>7</sup>	Ni 58,69 28 Ni 58,69 nikiel 4s <sup>2</sup> 3d <sup>8</sup>	Cu 63,55 29 Cu 63,55 miedź 4s <sup>1</sup> 3d <sup>10</sup>	Zn 65,38 30 Zn 65,38 cynk 4s <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup>	Ga 69,72 31 Ga 69,72 gal 4s <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup> 4p <sup>1</sup>	Ge 72,63 32 Ge 72,63 german 4s <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup> 4p <sup>2</sup>	As 74,92 33 As 74,92 arsen 4s <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup> 4p <sup>3</sup>	Se 78,97 34 Se 78,97 selen 4s <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup> 4p <sup>4</sup>	Br 79,90 35 Br 79,90 brom 4s <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup> 4p <sup>5</sup>	Kr 83,80 36 Kr 83,80 krypton 4s <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup> 4p <sup>6</sup>
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85,47 5 Rb 85,47 rub 5s <sup>1</sup>	Sr 87,62 38 Sr 87,62 stront 5s <sup>2</sup>	Y 88,91 39 Y 88,91 yttr 5s <sup>2</sup> 4d <sup>1</sup>	Zr 91,22 40 Zr 91,22 cytrkon 5s <sup>2</sup> 4d <sup>2</sup>	Nb 92,91 41 Nb 92,91 niob 5s <sup>1</sup> 4d <sup>4</sup>	Mo 95,95 42 Mo 95,95 molibden 5s <sup>1</sup> 4d <sup>5</sup>	Tc 97,91 43 Tc 97,91 technet 5s <sup>1</sup> 4d <sup>5</sup>	Ru 101,07 44 Ru 101,07 ruten 5s <sup>1</sup> 4d <sup>7</sup>	Rh 102,91 45 Rh 102,91 rod 5s <sup>1</sup> 4d <sup>8</sup>	Pd 106,42 46 Pd 106,42 pallad 5s <sup>1</sup> 4d <sup>9</sup>	Ag 107,87 47 Ag 107,87 srebro 5s <sup>1</sup> 4d <sup>10</sup>	Cd 112,41 48 Cd 112,41 kadm 5s <sup>1</sup> 4d <sup>10</sup>	In 114,82 49 In 114,82 ind 5s <sup>2</sup> 4d <sup>10</sup> 5p <sup>1</sup>	Sn 118,71 50 Sn 118,71 cyna 5s <sup>2</sup> 4d <sup>10</sup> 5p <sup>2</sup>	Sb 121,76 51 Sb 121,76 antymon 5s <sup>2</sup> 4d <sup>10</sup> 5p <sup>3</sup>	Te 127,60 52 Te 127,60 tellur 5s <sup>2</sup> 4d <sup>10</sup> 5p <sup>4</sup>	I 126,90 53 I 126,90 jod 5s <sup>2</sup> 4d <sup>10</sup> 5p <sup>5</sup>	Xe 131,29 54 Xe 131,29 ksenon 5s <sup>2</sup> 4d <sup>10</sup> 5p <sup>6</sup>
55	56	57-103	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Cs 132,91 6 Cs 132,91 cez 6s <sup>1</sup>	Ba 137,33 56 Ba 137,33 bar 6s <sup>2</sup>	La-Lu lantanowce	Hf 178,49 72 Hf 178,49 hafn 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>2</sup>	Ta 180,95 73 Ta 180,95 tantal 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>3</sup>	W 183,84 74 W 183,84 wolfram 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>4</sup>	Re 186,21 75 Re 186,21 ren 6s <sup>1</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>5</sup>	Os 190,23 76 Os 190,23 osm 6s <sup>1</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>6</sup>	Ir 192,22 77 Ir 192,22 iryd 6s <sup>1</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>7</sup>	Pt 195,08 78 Pt 195,08 platyna 6s <sup>1</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>9</sup>	Au 196,97 79 Au 196,97 złoto 6s <sup>1</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup>	Hg 200,59 80 Hg 200,59 rtęć 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup>	Tl 204,38 81 Tl 204,38 tal 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6p <sup>1</sup>	Pb 207,2 82 Pb 207,2 ołow 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6p <sup>2</sup>	Bi 208,98 83 Bi 208,98 bizmut 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6p <sup>3</sup>	Po 208,98 84 Po 208,98 polon 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6p <sup>4</sup>	At 209,99 85 At 209,99 astat 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6p <sup>5</sup>	Rn 222,02 86 Rn 222,02 radon 6s <sup>2</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6p <sup>6</sup>
87	88	89-103	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Fr 223,02 7 Fr 223,02 franc 7s <sup>1</sup>	Ra 226,03 88 Ra 226,03 rad 7s <sup>2</sup>	Ac-Lr aktynowce	Rf 267,12 104 Rf 267,12 rutherford 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>2</sup>	Db 268,13 105 Db 268,13 dubn 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>3</sup>	Sg 271,13 106 Sg 271,13 siaborg 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>4</sup>	Bh 274,14 107 Bh 274,14 bohrr 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>5</sup>	Hs 277,15 108 Hs 277,15 has 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>6</sup>	Mt 278,16 109 Mt 278,16 melnik 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>7</sup>	Ds 281,17 110 Ds 281,17 darmstadt 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>8</sup>	Rg 282,17 111 Rg 282,17 roentgen 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>9</sup>	Cn 285,18 112 Cn 285,18 kopernik 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>10</sup> 7p <sup>1</sup>	Nh 286,18 113 Nh 286,18 nihon 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>10</sup> 7p <sup>2</sup>	Fl 289,19 114 Fl 289,19 flerow 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>10</sup> 7p <sup>3</sup>	Mc 290,20 115 Mc 290,20 moskow 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>10</sup> 7p <sup>4</sup>	Lv 293,21 116 Lv 293,21 liwermor 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>10</sup> 7p <sup>5</sup>	Ts 294,21 117 Ts 294,21 tenes 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>10</sup> 7p <sup>6</sup>	Og 294,21 118 Og 294,21 oganeson 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>10</sup> 7p <sup>6</sup>
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
La 138,91 57 La 138,91 lantan 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Ce 140,12 58 Ce 140,12 cez 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Pr 140,91 59 Pr 140,91 prazeodym 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Nd 144,24 60 Nd 144,24 neodym 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Pm 144,91 61 Pm 144,91 promet 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Sm 150,36 62 Sm 150,36 samaryt 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Eu 151,96 63 Eu 151,96 europ 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Gd 157,25 64 Gd 157,25 gadolin 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Tb 158,93 65 Tb 158,93 terb 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Dy 162,50 66 Dy 162,50 dysproz 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Ho 164,93 67 Ho 164,93 holm 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Er 167,26 68 Er 167,26 erb 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Tm 168,93 69 Tm 168,93 tym 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Yb 173,04 70 Yb 173,04 terb 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>	Lu 174,97 71 Lu 174,97 lutet 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>			
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
Ac 227,03 89 Ac 227,03 aktyn 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Th 232,04 90 Th 232,04 tor 6d <sup>2</sup> 7s <sup>2</sup>	Pa 231,04 91 Pa 231,04 protaktyn 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	U 238,03 92 U 238,03 uran 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Np 237,05 93 Np 237,05 neptun 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Pu 244,06 94 Pu 244,06 pluton 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Am 243,06 95 Am 243,06 ameryc 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Cm 247,07 96 Cm 247,07 kury 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Bk 247,07 97 Bk 247,07 berkel 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Cf 251,08 98 Cf 251,08 kaliforn 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Es 252,08 99 Es 252,08 einstein 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Fm 257,10 100 Fm 257,10 ferm 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Md 258,10 101 Md 258,10 mendelew 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	No 259,10 102 No 259,10 nobel 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>	Lr 262,11 103 Lr 262,11 lorancj 6d <sup>1</sup> 7s <sup>2</sup>			

## Wartości promieni atomowych i jonowych pierwiastków

Źródło: GroMar Sp. z o.o., na podstawie Pazdro K., Rola-Noworyta A., *Chemia. Repetytorium dla przyszłych maturzystów i studentów*, Warszawa 2014., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po przeanalizowaniu zmian wartości promieni atomowych pierwiastków w pozostałych okresach, można wyciągnąć wniosek, że wartość promienia atomowego (wykluczając metale bloku *d* z rozważań oraz nieliczne wyjątki) maleje w okresie od grupy 1. do 17. Wynika to z faktu, że każdy kolejny atom w okresie posiada o więcej protonów i elektronów od poprzedniego, w związku z czym występuje silniejsze przyciąganie między protonami a elektronami, co skutkuje zmniejszeniem promienia atomowego.

## Energia jonizacji


### Już wiesz

Energia jonizacji to energia, której należy użyć, aby oderwać elektron od atomu, jonu, ale też cząsteczki. W przypadku atomów wieloelektronowych, elektrony mogą być odrywane po kolei, rozpoczynając od tego, który posiada najwyższą energię. Oznacza to, że pierwsza energia jonizacji to energia potrzebna do

oderwania elektronu od obojętnego atomu (potocznie zwana często energią jonizacji z pominięciem wskazania, że jest to pierwsza energia jonizacji). Druga energia jonizacji, to energia potrzebna do oderwania elektronu od jednododatniego kationu, natomiast trzecia jest energią konieczną do oderwania elektronu od dwudodatniego kationu.

## Polecenie 2

Sformułuj wniosek na temat zmian w wartościach (pierwszej) energii jonizacji dla pierwiastków drugiego okresu układu okresowego.



Wykres zależności I energii jonizacji od liczby atomowej pierwiastków

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.


## Odpowiedź


Wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastków, należących do drugiego okresu układu okresowego, energia jonizacji **generalnie** rośnie. Widoczne są wprawdzie pewne wahania – bor wykazuje nieznacznie niższą energię jonizacji od berylu, a tlen od azotu, niemniej w grupie utrzymuje się tendencja wzrostowa. Wzrost energii jonizacji w okresie jest związany ze zmianą promienia atomowego: im bliżej jądra atomowego znajduje się elektron, tym trudniej go oderwać (bo jest silniej przyciągany), a zatem energia jonizacji jest wyższa.

Pierwszy jest atom litu – jego elektron walencyjny znajduje się na drugiej powłoce elektronowej, a promień wynosi 152 pm. Energia jonizacji dla atomu litu wynosi 5,39 eV. Oznacza to, że dla jednego atomu litu należy dostarczyć 5,39 eV, aby oderwać jeden elektron i utworzyć jeden kationów litu:



Kolejny w okresie atom to beryl. Elektron, który oderwany zostanie od atomu, znajduje się również na drugiej powłoce (jak w przypadku litu). Ze względu na silniejsze przyciąganie między jądrem atomowym a elektronami (związane z większą ilością protonów w jądrze i większą ilością elektronów na powłoce drugiej), promień atomu berylu jest mniejszy od promienia atomu litu i wynosi 114 pm. Oznacza to, że odrywany elektron jest bliżej jądra atomowego, a zatem trudniej go oderwać, ponieważ działa na niego silniejsze przyciąganie od jądra atomowego. Energia jonizacji dla atomu berylu wynosi 9,32 eV. Oznacza to, że należy dostarczyć 9,32 eV energii do atomu berylu, aby oderwać jeden elektron i utworzyć kation berylu:







Graficzny zapis konfiguracji elektronowej atomu i kationu boru

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Atom boru nieco łatwiej odda elektron niż atom berylu, ponieważ w czasie jonizacji powstaje względnie stabilna konfiguracja elektronowa – jon  $B^+$  posiada całkowicie zamkniętą podpowłokę  $2s$  i pustą podpowłokę  $2p$ . Zapamiętaj od teraz, że zamknięcie danej powłoki jest dla atomu korzystne energetycznie.





Graficzny zapis konfiguracji elektronowej atomu i kationu tlenu


Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zwróć teraz uwagę jak przebiega proces jonizacji atomu tlenu. W czasie oderwania pierwszego elektronu jon  $O^+$  zyskuje względnie stabilną konfigurację – powłoka  $2p$  zostaje połowicznie obsadzona. Teraz już wiesz, że stabilne konfiguracje elektronowe gwarantuje nie tylko całkowite wypełnienie danej podpowłoki, ale również jej połowiczne wypełnienie. Jak już wiesz, jest to również szczególnie widoczne w przypadku pierwiastków bloku  $d$ . Przypomnij sobie, że atom chromu rozmieszcza swoje elektrony walencyjne w postaci konfiguracji  $4s^1 3d^5$ , a nie  $4s^2 3d^4$ . Połowiczne wypełnienie podpowłoki  $d$  daje bowiem dużo większą stabilność i korzyści energetyczne niż zamknięcie podpowłoki  $4s$ .

## Powinowactwo elektronowe

### Już wiesz

[Powinowactwo elektronowe](#) to wielkość, która określa, jaka ilość energii wydzieli się na skutek przyłączenia elektronu do atomu lub cząsteczki



Zwróć uwagę, że zgodnie z definicją dodatnie powinowactwo wskazuje energię wydzieloną. Istnieją jednak atomy, dla których pierwsze powinowactwo może przyjmować wartość ujemną. Oznacza to zatem, że na skutek przyłączenia elektronu nie następuje wydzielenie energii, ale energia to zostaje pochłonięta, a więc proces przyłączenia elektronu wymaga dodania energii.

	1								18							
1	H 1,01 0,75416								He 4,00 (0,0)							
2	Li 6,94 0,6180	2	Be 9,01 (-0,3)	13	B 10,81 0,2797	14	C 12,01 1,2621	15	N 14,01 0,0	16	O 16,00 1,46111	17	F 19,00 3,40119	18	Ne 20,18 (-0,40)	
3	11	Na 22,99 0,5479	12	Mg 24,31 (0,0)	13	Al 26,98 0,4328	14	Si 28,09 1,3895	15	P 30,97 0,7465	16	S 32,07 2,07712	17	Cl 35,45 3,6127	18	Ar 39,95 (-0,36)
4	19	K 39,10 0,5015	20	Ca 40,08 0,0245	31	Ga 69,72 0,43	32	Ge 72,63 1,2327	33	As 74,92 0,81	34	Se 78,96 2,0207	35	Br 79,90 3,36359	36	Kr 83,80 (-0,40)
5	37	Rb 85,47 0,04859	38	Sr 87,62 0,048	49	In 114,82 0,3	50	Sn 118,71 1,1121	51	Sb 121,76 1,05	52	Te 127,60 1,9709	53	I 126,90 3,05904	54	Xe 131,29 (-0,42)
6	55	Cs 132,91 0,47163	56	Ba 137,33 0,145	81	Tl 204,38 0,4	82	Pb 207,20 (0,36)	83	Bi 208,98 0,9424	84	Po (209) 1,9	85	At (210) (2,8)	86	Rn (222) <0

### Powinowactwo elektronowe pierwiastków grup głównych [eV]

Źródło: GroMar Sp. z o.o., na podstawie Mizerski W., *Tablice Chemiczne*, Adamantan, 2004, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powinowactwo wskazuje nam zatem, jak „chętnie” anionem stanie się dany atom. Im wyższa, dodatnia wartość powinowactwa, tym większa „chęć” atomu do przyłączenia elektronu. Ujemne powinowactwo spotyka się w przypadku pierwiastków, które nie potrzebują i nie chcą przyłączać elektronu.

Powinowactwa elektronowego nie zmienia się regularnie, ani w grupie, ani w okresie. Możemy wymienić prawidłowość, polegającą na tym, że w sekwencji pierwiastków 15., 16. i 17. grupy tego samego okresu powinowactwo rośnie i przyjmuje wysokie wartości. Związane jest to z faktem, że maleje promień atomowy, a im bliżej jądra znajdować się będzie dołączony elektron, tym silniejsze przyciąganie będzie na niego działać.

# Elektroujemność

Elektroujemność to zdolność do przyciągania elektronów. Przyjrzyj się poniższemu układowi okresowemu, przedstawiającemu wartości elektroujemności dla pierwiastków, a następnie zastanów się, jak zmienia się elektroujemność w okresie. Weź pod uwagę tylko pierwiastki należące do grup głównych 1., 2., od 13. do 17. układu okresowego.

1																		18																															
1	2																13		14		15		16		17		18																						
1	H																	He																															
2	Li	Be															B	C	N	O	F	Ne																											
3	Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar																											
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr																															
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe																															
6	Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn																															
7	Fr	Ra	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og																															
<table border="1"> <tr> <td>57</td><td>La</td><td>Ce</td><td>Pr</td><td>Nd</td><td>Pm</td><td>Sm</td><td>Eu</td><td>Gd</td><td>Tb</td><td>Dy</td><td>Ho</td><td>Er</td><td>Tm</td><td>Yb</td><td>Lu</td> </tr> <tr> <td>89</td><td>Ac</td><td>Th</td><td>Pa</td><td>U</td><td>Np</td><td>Pu</td><td>Am</td><td>Cm</td><td>Bk</td><td>Cf</td><td>Es</td><td>Fm</td><td>Md</td><td>No</td><td>Lr</td> </tr> </table>																		57	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	89	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
57	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu																																		
89	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr																																		

## 1

Elektroujemność to zdolność do przyciągania elektronów. Spójrzmy na atom azotu. W jego przypadku nowy elektron przyciągany jest na drugą powłokę, znajdującą się blisko jądra atomowego. Oznacza to, że na elektron ten działają duże siły przyciągania elektrostatycznego od jądra atomowego, które „pomagają” dołączyć elektron. Promień atomu azotu wynosi 70 pm. Elektroujemność azotu to 3,0. Kolejnym atomem w drugiej grupie jest tlen. W jego przypadku nowy elektron przyciągany jest także na drugą powłokę, która znajduje się jeszcze bliżej jądra atomowego niż w przypadku azotu. Promień atomu tlenu wynosi 66 pm. Oznacza to, że na elektron działają jeszcze większe siły przyciągania elektrostatycznego od jądra atomowego. Elektroujemność tlenu, a więc zdolność do przyciągania elektronu jest większa niż w przypadku azotu i wynosi 3,5. Następnym atomem w drugim okresie jest fluor. Nowy elektron jest również przyciągany na drugą powłokę, zlokalizowaną jeszcze bliżej jądra atomowego niż w przypadku tlenu. Promień atomu fluoru wynosi 58 pm. W związku z tym na elektron działają jeszcze większe

siły przyciągania elektrostatycznego od jądra atomowego, a fluor posiada najwyższą wartość elektroujemności, wynoszącą 4,0.

Tablica elektroujemności pierwiastków wg skali Paulinga

Źródło: GroMar Sp. z o.o., na podstawie W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004., licencja: CC BY-SA 3.0.

Elektroujemność pierwiastków rośnie w okresie, co jest konsekwencją malejącej odległości między jądrem atomowym a powłoką walencyjną, na której ma pojawić się nowy elektron. Im bliżej jądra atomowego obecna jest powłoka walencyjna, tym łatwiej umieścić na niej nowy elektron, ze względu na silniejsze przyciąganie elektrostatyczne. Jeśli powłoka walencyjna znajduje się dalej od jądra atomowego, to trudniej umieścić na niej elektron, ponieważ siły przyciągania elektrostatycznego są mniejsze.

## Charakter metaliczny

Charakter metaliczny pierwiastków wiąże się ze zdolnością oddawania elektronu lub elektronów walencyjnych. Proces ten zachodzi łatwo, jeśli wymaga dostarczenia niewielkiej energii, a więc dotyczy pierwiastków charakteryzujących się niską wartością energii jonizacji. Jak już ustaliliśmy wcześniej, energia jonizacji (pomijając wyjątki) rośnie w okresie (biorąc pod uwagę tylko grupy główne), a zatem charakter metaliczny maleje w okresie. Najsilniejsze właściwości metaliczne posiadają pierwiastki bloku *s*, nieco słabsze pierwiastki bloku *d*, natomiast najłżejsze pierwiastki bloku *p* to głównie niemetale.

## Charakter niemetaliczny

Charakter niemetaliczny pierwiastków polega na przyłączaniu elektronów do powłoki walencyjnej. Proces ten zachodzi łatwo, jeśli w jego wyniku wydziela się dużo energii, a więc dotyczy pierwiastków charakteryzujących się wysoką wartością

powinowactwa elektronowego. Najwyższe wartości powinowactwa elektronowego posiadają pierwiastki 17. grupy. Charakter niemetaliczny rośnie zatem w stronę prawą w okresie, a więc ze wzrostem liczby atomowej.

## Słownik

### **promień atomowy**

liczba określająca wielkość atomu

### **energia jonizacji**

(pierwsza) energia potrzebna do oderwania najslabiej związanego elektronu od obojętnego atomu lub cząsteczki

### **powinowactwo elektronowe**

wielkość określająca zdolność atomu lub cząsteczki do przyłączenia elektronu z utworzeniem jonu ujemnego

### **elektroujemność**

zdolność do przyciągania elektronów

## Bibliografia

Encyklopedia PWN

Pazdro K., Rola – Noworyta A., *Chemia. Repetytorium dla przyszłych maturzystów i studentów*, Warszawa 2014.

# Film edukacyjny

---

## Polecenie 1

Jak zmieniają się właściwości pierwiastków w obrębie okresów układu okresowego?

Trwa wczytywanie danych ..

**JAK ZMIENIAJĄ SIĘ WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I  
FIZYCZNE PIERWIASTKÓW W OBRĘBIE  
OKRESÓW UKŁADU OKRESOWEGO?**

*opowiada dr hab. Elżbieta Grządka*

Film dostępny pod adresem </preview/resource/R1X3G1CUaBM0Z>

Film edukacyjny pt. „Jak zmieniają się właściwości pierwiastków w obrębie okresów układu okresowego?”

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film nawiązujący do treści materiału dotyczącego zmian właściwości pierwiastków w obrębie okresów układu okresowego.

---

### **Ćwiczenie 1**

Uwzględniając struktury elektronowe atomów, odpowiedz, dlaczego energia jonizacji magnezu jest wyższa od energii jonizacji glinu.

### **Ćwiczenie 2**

Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków z zaznaczonymi wartościami elektroujemności wg skali Paulinga, przedstawiający atomy znajdujące się w 2. okresie. Wstaw strzałki, których groty będą przedstawiały w prawidłowym kierunku wzrost danej właściwości fizycznej.

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

### **Ćwiczenie 3**

Zaznacz poprawne stwierdzenia.

## Ćwiczenie 4

Uszereguj pierwiastki:

A. zgodnie z rosnącym promieniem atomowym

- O
- B
- Ne
- Li
- Be
- F
- C
- N


B. zgodnie z rosnącą elektroujemnością

- P
- Cl
- Al
- S
- Si
- Na
- Mg

## Ćwiczenie 5

Odpowiedz na pytanie. Dlaczego wraz ze wzrostem liczby atomowej reaktywność metali w okresie maleje?


# Sprawdź się

Pokaż ćwiczenia:   

## Ćwiczenie 1



Strzałki na rysunku przedstawiają zmiany właściwości pierwiastków na tle układu okresowego. Na podstawie rysunku uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą zmiany niektórych właściwości pierwiastków. W rozważaniach należy wziąć pod uwagę tylko pierwiastki grup głównych, 1., 2. i 13.-17.



Informacja do ćwiczenia nr 1

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

## Ćwiczenie 2



Połącz w pary pierwiastki z odpowiadającymi im wartościami promieni atomowych.

114 pm, 121 pm, 197 pm, 227 pm, 117 pm

K	
Ca	
As	
Se	
Br	

## Ćwiczenie 3



Połącz w pary pierwiastki z odpowiadającymi im wartościami elektroujemności wg skali Paulinga.

1,5, 2,1, 2,5, 3,0, 1,8

Al	
Si	
P	
S	
Cl	

## Ćwiczenie 4



Uszereguj pierwiastki: O, N, C według:

A. rosnącego charakteru niemetalicznego (największy charakter niemetaliczny u dołu):

- O
- N
- C

B. malejącego promienia atomowego (najmniejszy promień atomowy u dołu):

- N
- C
- O

## Ćwiczenie 5



W tabeli podano wartości promieni atomowych fosforu, siarki i chloru.

Fosfor	Siarka	Chlor
110 pm	104 pm	99 pm

Na podstawie analizy tabeli wybierz prawidłowe stwierdzenia w nawiasach.

Promień atomu siarki jest mniejszy większy od promienia atomu fosforu, ponieważ atom siarki zbudowany jest z większej mniejszej liczby protonów i większej mniejszej liczby elektronów niż atom fosforu. W związku z tym przyciąganie elektrostatyczne pomiędzy jądrem a elektronami jest silniejsze w przypadku atomu fosforu siarki, co skutkuje zmniejszeniem zwiększeniem wartości promienia atomowego. Promień atomu chloru jest mniejszy większy od promienia siarki.

## Ćwiczenie 6



Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

symbol pierwiastka — **Cr** — masa atomowa [u]  
liczba atomowa (A) — **24** chrom — elektroujemność wg skali Paulinga

nazwa pierwiastka

1	1,01							
1	<b>H</b> 1 wodór	2	13	14	15	16	17	
2	6,94 <b>Li</b> lit	9,01 <b>Be</b> beryl	10,81 <b>B</b> bor	12,01 <b>C</b> węgiel	14,01 <b>N</b> azot	16,00 <b>O</b> tlen	19,00 <b>F</b> fluor	
3	22,99 <b>Na</b> sód	24,31 <b>Mg</b> magnez	26,98 <b>Al</b> glin	28,09 <b>Si</b> krzem	30,97 <b>P</b> fosfor	32,07 <b>S</b> siarka	35,45 <b>Cl</b> chlor	
4	39,10 <b>K</b> potas	40,08 <b>Ca</b> wapń	69,72 <b>Ga</b> gal	72,63 <b>Ge</b> german	74,92 <b>As</b> arsen	78,97 <b>Se</b> selen	79,90 <b>Br</b> brom	
5	85,47 <b>Rb</b> rubid	87,62 <b>Sr</b> stront	114,82 <b>In</b> ind	118,71 <b>Sn</b> cyna	121,76 <b>Sb</b> antymon	127,60 <b>Te</b> tellur	126,90 <b>I</b> jod	
	37	38	49	50	51	52	53	

Ilustracja do ćwiczenia

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Spośród pierwiastków widocznych na załączonym fragmencie układu okresowego wybierz te, które spełniają wymienione poniżej właściwości. W puste pola wpisz symbole pierwiastków.

## Ćwiczenie 7



Dopasuj wykres do jego nazwy.

liczba\_atomowa : 1

liczba : 3

promień\_atomowy : 155

liczba\_atomowa : 2

liczba : 4

promień\_atomowy : 115

liczba\_atomowa : 3

liczba : 5

promień\_atomowy : 90

liczba\_atomowa : 4

liczba : 6

promień\_atomowy : 80

liczba\_atomowa : 5

liczba : 7

promień\_atomowy : 70

liczba\_atomowa : 6

liczba : 8

promień\_atomowy : 65

liczba\_atomowa : 7

liczba : 9

promień\_atomowy : 60

liczba\_atomowa : 8

liczba : 10

promień\_atomowy : 160

liczba\_atomowa : 1

liczba : 3

energia\_jonizacji : 500

liczba\_atomowa : 2

liczba : 4

energia\_jonizacji : 900

liczba\_atomowa : 3

liczba : 5

energia\_jonizacji : 800

liczba\_atomowa : 4

liczba : 6

energia\_jonizacji : 1100

liczba\_atomowa : 5

liczba : 7

energia\_jonizacji : 1400

liczba\_atomowa : 6

liczba : 8

energia\_jonizacji : 1300

liczba\_atomowa : 7

liczba : 9

energia\_jonizacji : 1700

liczba\_atomowa : 8

liczba : 10

energia\_jonizacji : 2100

liczba\_atomowa : 1

liczba : 3

elektroujemność : 1.00

liczba\_atomowa : 2

liczba : 4

elektroujemność : 1.50

liczba\_atomowa : 3

liczba : 5

elektroujemność : 2.00

liczba\_atomowa : 4

liczba : 6

elektroujemność : 2.50

liczba\_atomowa : 5

liczba : 7

elektroujemność : 3.00

liczba\_atomowa : 6

liczba : 8

elektroujemność : 3.50

liczba\_atomowa : 7

liczba : 9

elektroujemność : 4.0

liczba\_atomowa : 1  
liczba : 3  
powinowactwo\_elektronowe : -50

liczba\_atomowa : 2  
liczba : 4  
powinowactwo\_elektronowe : 25

liczba\_atomowa : 3  
liczba : 5  
powinowactwo\_elektronowe : -25

liczba\_atomowa : 4  
liczba : 6  
powinowactwo\_elektronowe : -125

liczba\_atomowa : 5  
liczba : 7  
powinowactwo\_elektronowe : 0

liczba\_atomowa : 6  
liczba : 8  
powinowactwo\_elektronowe : -150

liczba\_atomowa : 7  
liczba : 9  
powinowactwo\_elektronowe : -325

liczba\_atomowa : 8  
liczba : 10  
powinowactwo\_elektronowe : 50

Wykres D, Wykres C, Wykres A, Wykres B

Wykres zależności energii jonizacji od liczby	
--	--

atomowej dla pierwiastków drugiego okresu układu okresowego.

Wykres zależności elektryczności od liczby atomowej dla pierwiastków drugiego okresu układu okresowego.

Wykres zależności powinowactwa elektronowego od liczby atomowej dla pierwiastków drugiego okresu układu okresowego.

Wykres zależności promienia atomowego od liczby atomowej dla pierwiastków drugiego okresu układu okresowego.

## Ćwiczenie 8



Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, którego przebieg pozwoli wykazać, jak zmienia się aktywność metali w okresie.

Uzupełnij schemat doświadczenia, wybierając nazwy odczynników z podanych poniżej.

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Probówki można ogrzać za pomocą palnika spirytusowego.

Obserwacje:

---

---

Wnioski:

---

# Dla nauczyciela

---

## Scenariusz zajęć

**Autor:** Amanda Gałkowska, Krzysztof Błaszczak

**Przedmiot:** chemia

**Temat:** Jak zmieniają się właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków w obrębie okresów?

**Grupa docelowa:** uczniowie III etapu edukacyjnego, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony; uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

### Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków. Uczeń:

3) wskazuje związek między budową elektronową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym i jego właściwościami fizycznymi (np. promieniem atomowym, energią jonizacji) i chemicznymi.

Zakres rozszerzony

II. Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków. Uczeń:

5) określa przynależność pierwiastków do bloków konfiguracyjnych: s, p i d układu okresowego na podstawie konfiguracji elektronowej; wskazuje związek między budową elektronową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym i jego

właściwościami fizycznymi (np. promieniem atomowym, energią jonizacji) i chemicznymi.

### **Kształtowane kompetencje kluczowe:**

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
- kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
- kompetencje cyfrowe;
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

### **Cele operacyjne**

#### **Uczeń:**

- formułuje wniosek dotyczący zmiany wartości promienia atomowego w okresie;
- koreluje zmiany wielkości promieni atomowych w okresie ze zmianą energii jonizacji;
- formułuje wniosek dotyczący zmiany wartości powinowactwa elektronowego w okresie;
- uzasadnia zmiany elektroujemności w okresie;
- ocenia, jakie czynniki mają wpływ na zmianę charakteru metalicznego i niemetalicznego pierwiastków.

#### **Strategie nauczania:**

- asocjacyjna.

#### **Metody i techniki nauczania;**

- dyskusja dydaktyczna;
- film edukacyjny;

- analiza materiału źródłowego;
- ćwiczenia uczniowskie;
- technika termometr.

### **Formy pracy:**

- praca zbiorowa;
- praca indywidualna.

### **Środki dydaktyczne:**

- komputery ze słuchawkami, głośnikami i z dostępem do Internetu;
- zasoby multimedialne zawarte w e-materiale;
- rzutnik multimedialny;
- tablica interaktywna/tablica i kreda/pisak.

### **Przebieg zajęć**

#### **Faza wstępna:**

1. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel przedstawia uczniom model atomu litu, berylu i boru – przedstawiający wielkość promienia atomu, po czym zadaje uczniom pytanie: Czym atomy tych pierwiastków różnią się od siebie?
2. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala cele lekcji, które uczniowie zapisują na kartkach i gromadzą w portfolio.
3. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej uczniów. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jak brzmi prawo okresowości?

#### **Faza realizacyjna:**

1. Nauczyciel losowo przydziela uczniów do czterech grup. Liderzy grup losują numer oznaczający numer okresu w układzie okresowym, którego

charakterystykę będą przeprowadzać. Na podstawie dostępnych źródeł, zbierają informacje dotyczące wartości promieni atomowych, energii jonizacji, elektroujemności i powinowactwa elektronowego pierwiastków należących do badanego okresu. Każdy z uczniów losuje nazwę pierwiastka, by przygotować o nim informację (pierwiastki wymienione powyżej). Pozyskane informacje posłużą uczniom, by wspólnie wyciągnąć wnioski na temat zmian omawianych właściwości w danym okresie.

2. Uczniowie w formie krótkiej prezentacji na forum klasy przedstawiają zebrane dane.
3. Uczniowie oglądają w parach film edukacyjny, zawarty w e-materiale, i układają pytania do filmu, po czym wspólnie sobie je zadają i udzielają odpowiedzi, celem utrwalenia wiadomości. Następnie wykonują zawarte w medium polecenia.
4. Uczniowie zastanawiają się nad znaczeniem pojęcia „charakter niemetaliczny”. Celem jest wyciągnięcie wniosku na temat zmiany charakteru niemetalicznego w okresie.
5. Uczniowie samodzielnie sprawdzają swoją wiedzę, wykonując ćwiczenia zawarte w e-materiale w sekcji „sprawdź się”.

### **Faza podsumowująca:**

1. Na zakończenie nauczyciel stosuje narzędzie do oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zastosowaniem termometru przez uczniów. Uczniowie na skali temperatury zaznaczają cenkami, w jakim stopniu opanowali zagadnienia wynikające z zamierzonych do osiągnięcia celów lekcji. Jeżeli ze skali będzie wynikał niski poziom temperatury, uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób podnieść swój poziom posiadanej wiedzy.

### **Praca domowa:**

Uczniowie wykonują zawarte w e-materiale w sekcji „Sprawdź się” pozostałe ćwiczenia, których nie zdążyli wykonać na lekcji.

### **Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:**

Medium może zostać wykorzystane przez ucznia jako materiał wprowadzający do lekcji lub jako powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem. Uczniowie nieobecni na lekcji mogą film wykorzystać jako źródło informacji do samokształcenia celem uzupełnienia luk kompetencyjnych.

### **Materiały pomocnicze:**

1. Polecenie podsumowujące (nauczyciel przed lekcją zapisuje je na niewielkich kartkach):

- Czy energia jonizacji rośnie w okresie?
- Czy promień atomowy maleje w okresie?
- Czy najwyższą elektroujemność w okresie posiadają atomy o najmniejszej masie atomowej?
- Czy największą wartość bezwzględną powinowactwa elektronowego posiadają atomy o największej masie atomowej w okresie?
- Jak zmienia się charakter niemetaliczny w okresie?
- Jak zmienia się charakter metaliczny w okresie?

2. Nauczyciel przygotowuje narzędzie do oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zastosowaniem termometru przez uczniów, a także cenki dla uczniów oraz kartki i mazaki.